

9

6.8.12 ZOEČER

V območjih, kjer so bile v zadnjem obdobju pogoste padavine in je zračna vlaga visoka, se na grozdju širi oidij vinske trte. Ob močnih rosah in pogostih plohah so razmere ugodne tudi za širjenje peronospore. V vinogradih, kjer se pojavlja oidij priporočamo takojšnje žveplanje trt v območju grozdov z uporabo žvepla v prahu (**Žveplo v prahu – solfotecnica**), v količini 15 do 20 kg/ha. Žveplanje opravite v mirnem vremenu in v večernih urah. Čez kakšen dan trte poškopite s fungicidom. Priporočamo rabo enega izmed pripravkov kot so **Collis, Crystal, Domark 100 EC, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane gold 350 EC, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Stroby WG, Talendo, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Vivando** in podobni. Škropivu dodajte tudi enega izmed žveplovih pripravkov kot je **Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG** ali **Močljivo žveplo**.

Kjer so jagode poškodovane od toče ali oidija priporočamo tudi varovanje grozdja pred gnitjem z uporabo enega izmed naslednjih fungicidov: **Switch 62,5 WG, Cantus, Mythos, Teldor SC 500, Pyrus 400 SC** ali **Rovral aquaflo**.

Za varstvo proti peronospori lahko uporabite **Bakreni antracol, Antracol, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Folpan 80 WDG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Polyram DF** ali katerega od bakrovih pripravkov. Če je v vinogradih veliko peronospore uporabite fungicid z delno sistemskim delovanjem kot so **Antracol combi, Aviso DF, Curzate M, Curzate R** in podobni.

Kjer se na spodnjih trtnih listih pojavlja medžilno rumenenje oziroma znaki pomanjkanja magnezija, lahko škropivu dodate tudi magnezijevo gnojilo in s tem preprečite oziroma omilite venenje grozdnih pecljev ob trgatvi.

Ameriški škržatek

Vinogradnike v okuženih in ogroženih območjih z zlato trsno rumenico opozarjamo na spremljanje populacije ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. V primeru, da se na ploščo v enem tednu ujamejo več kot štirje škržatki je potrebno opraviti še eno škropljenje z insekticidom. Uporabite lahko pripravek **Actara 25 WG** v odmerku 200 g/ha. Škropljenje opravite v začetku avgusta oz. tako, da upoštevate varnostno dobo pripravka, ki znaša 14 dni.

Pripravila: **Danica Dobrovoljc**, Kmetijski Inštitut Slovenije (30.07.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani <http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6989>.