

2. 18.5.2012

Obvestilo dne, 8. 5. 2012

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in Spodnje Savinjske doline, so na sortah, ki so hitreje v razvoju kot so Chardonnay, Modra frankinja mladice v povprečju dolge 25 cm (na sončnih legah tudi do 30 cm) in imajo razvitih že 5 do 6 listov (BBCH 15 - 16). Sledijo sorte Beli in Sivi pinot z dolžino mladice do 20 cm in 4 razvitimi listi (BBCH 14) medtem, ko so mladice pri sorti Sauvignonu dolge od 15 do 20 cm in imajo razvite 3 do 4 liste (BBCH 13 – 14). V razvoju najbolj zaostajata sorti Renski in Laški rizling s povprečno dolgimi mladnicami 15 cm in z 3 do 4 razvitimi listi BBCH (13 – 14).

Peronospora in oidij vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in Spodnje Savinjske doline je na opazovanih lokacijah od 3. do 7. maja padlo od 20 (Gabernik – Rogaška) do 48,8 (Ponikva) mm padavin, kar je izpolnilo pogoj za prvo primarno okužbo s peronosporo vinske trte. Na opazovanih lokacijah je model za napoved peronospore med 4. in 7. majem javil izpolnjene pogoje za prvo primarno okužbo s peronosporo vinske trte. Inkubacijska doba se bo predvidoma iztekla ob med 13. in 16. majem. Zato svetujemo, da ob koncu tega tedna in pred padavinami, opravite prvo škropljenje proti peronospori z enim od kontaktnih fungicidov kot so: **Delan 700 WG** v 0,05 % konc., **Folpan 80 WDG** v 0,125-0,15 % konc., **Antracol** ali **Antracol WG 70** v 0,2 % konc., **Dithane DG Neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil 80 WP** ali **Pinozeb M – 45** v 0,2 % konc. ali **Polyram DF** v 0,24 % konc.. Za zatiranje oidija dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Vindex 80 WG**, **Kumulus DF**, **Močljivo žveplo**, **Pepelin** ali **Thiovit Jet** v odmerku 3-6 kg/ha.

Še posebej pomembno je, da škropljenje pravočasno opravite pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju in imajo mladice dolge nad 20 cm.

V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo uporabo fungicidov **Quadrus** (0,075 do 0,1 % konc.) ali **Universalis** (0,2 % konc.), ki imajo delovanje tako na oidij kot peronosporo. Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi pripravek **Karathane Gold 350 EC** (0,05% do 0,06% konc.) ali **Stroby WG** (0,01 do 0,02 % konc.).

*Pripravka Folpan 80 WDG in Universalis sta registrirana samo za pridelavo vinskega grozdja.

Grozni sukači

Na feromonskih se že lovijo metuljčki križastih in pasastih grozdnih sukačev. O številčnosti ulovov in optimalnem času zatiranja v primeru presežanja praga škodljivosti vas bomo obveščali.

Datum objave obvestila: 9.5.2012 10:23:40

Obvestilo prognostičnega centra: Inštitut za Hmeljarstvo in Pivovarstvo Slovenije

Uredila: Alenka Ferlež-Rus